

Modulo di screening per la denervazione renale (RDN)

PAZIENTE

1 Pazienti con pressione arteriosa non controllata

- Pressione arteriosa sistolica ambulatoriale ≥ 140 mmHg E/O
- Pressione arteriosa non ambulatoriale non controllata (domiciliare o ABPM)

2 Farmaci per abbassare la pressione arteriosa

- ≥ 3 farmaci antipertensivi più tollerati in assoluto (ACE-I o ARB + CCB + diuretico come doppia o triplice combinazione)
- < 3 in caso di intolleranza

3 Il paziente ha dimostrato interesse verso la denervazione renale

- Sì

CRITERI DI ESCLUSIONE (paziente non candidato)

- Forme note di ipertensione secondaria elencate sotto*
- Gravidanza
- Età inferiore a 18 anni

FATTORI DI RISCHIO SUPPLEMENTARI (facoltativi)

- Ictus pregresso
- Attacco ischemico transitorio
- Infarto miocardico pregresso
- Coronaropatia
- Insufficienza cardiaca
- Fibrillazione atriale
- Fumo
- Diabete mellito
- Malattia vascolare periferica

Ospedalizzazioni (ricoveri) correlate a ipertensione negli ultimi 12 mesi

.....
Accessi in pronto soccorso correlati a ipertensione negli ultimi 12 mesi
.....

* Aldosteronismo primario, feocromocitoma/paraganglioma, sindrome di Cushing, iperparatiroidismo primario e sindromi da eccesso di mineralcorticoidi

Denervazione renale come terza opzione di trattamento per l'ipertensione arteriosa

La Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) appoggiata dalla European Renal Association (ERA) e dall'International Society of Hypertension (ISH) ha pubblicato le proprie linee guida e riconosciuto la denervazione renale (RDN) come terza opzione di trattamento per l'ipertensione.



1 Cambiamento dello stile di vita



2 Terapia farmacologica



3 Denervazione renale con ultrasuoni

Che cos'è la denervazione renale (RDN) con ultrasuoni?

- Trattamento mini-invasivo, sicuro, applicato una sola volta, che ha dimostrato di essere efficace nella riduzione dell'ipertensione.²⁻⁵
- I rapidi tempi di recupero consentono di tornare facilmente alla routine quotidiana.
- Offre una riduzione della pressione arteriosa nelle 24 ore.²⁻⁵

Per maggiori informazioni consultare:
www.recormedical.eu



Contattare un centro specializzato:



Medico inviante:



Contatto del centro informazioni

Dati di contatto

Fonti: 1. Mancia et al. Journal of Hypertension 2023, 41:1874-2017; 2. Azizi M. JAMA. 2023;329(8):651-661; 3. Azizi M. et al. Lancet. 2018 Jun 9; 391(10137):2335-2345; 4. Azizi M. et al. Lancet. 2021 Jun 26;397(10293):2476-2486; 5. Kirtane A. et al. JAMA Cardiol. 2023;8(5):464-473

Indicazioni per l'uso: il catetere Paradise è indicato per la denervazione renale percutanea. Per ulteriori informazioni su indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni, eventi avversi e rischi, consultare le istruzioni per l'uso complete.

© 2024 Recor Medical, Inc. Tutti i diritti riservati. MKT-0205 EMEA/ 04-2024

RECOR MEDICAL / OTSUKA MEDICAL DEVICES EUROPE GMBH, Europa-Allee 52, 60207 Francoforte sul Meno, Germania